



LE QUOTIDIEN DU MEDECIN

www.quotimed.com - N° 8259

LUNDI 19 NOVEMBRE 2007



COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

L'ultimatum des urgentistes
et anesthésistes

PAGE 4



LA FMC AU QUOTIDIEN

L'avion et les maladies
transmissibles

PAGE 15



MÉCANISME INFECTIEUX

Des bactéries agissent
localement ou à distance

PAGE 9

VIH : vite, les tests rapides

Alors que 48 % des malades du sida ignorent leur séropositivité, Roselyne Bachelot pourrait répondre dans les jours qui viennent à la demande des associations d'autoriser l'utilisation « hors les murs » des tests rapides de dépistage du VIH. Simples à réaliser, y compris par des non-

professionnels, et permettant d'obtenir un résultat en 15-20 minutes, ces tests ont déjà été expérimentés avec succès dans des projets pilotes en Europe. L'enjeu : mieux adapter le dépistage à des populations à risque qui y sont rétives, pour des raisons que l'on connaît encore mal

PAGE 16

Le président du CNFMC des libéraux répond à Roselyne Bachelot

Pour Bernard Ortolan,
pas question de reporter
la FMC aux calendes
grecques

PAGE 3

Un virus prometteur contre certains cancers

Le potentiel oncolytique
du Seneca Valley Virus
se confirme chez l'animal

PAGE 8

Trois psychiatres contre la décision d'un préfet

L'ombre des quotas sur
des agréments médicaux

PAGE 22



AFP

Du nævus au mélanome

Une équipe de chercheurs CNRS-Institut Curie vient d'élucider une des composantes d'un phénomène plus rare qu'on ne le pense : la transformation d'un nævus en mélanome. Sous l'action de la bêta-caténine les mélanocytes des nævi quittent leur état de sénescence pour devenir immortels et donc capables d'induire la transformation tumorale

PAGE 10

ÉTUDE

Thé en dialyse

Non, les dialysés étant soumis à une restriction hydrique, on ne leur a pas fait boire de thé. En revanche, on a testé un extrait de thé vert décaféiné (catéchines). Objectif : évaluer l'effet sur la production de radicaux oxygènes, sur les facteurs de risque d'athérosclérose et les cytokines pro-inflammatoires. Premier temps, la cinétique : après une dose orale de catéchines, le pic plasmatique est retardé chez 10 dialysés par rapport à 6 sujets sains. Deuxième temps : chez 10 dialysés, l'effet antioxydant, au cours d'une séance de dialyse, de catéchines (3 dosages différents ont le même effet) est supérieur à celui du placebo et de 500 mg de vitamine C ; l'expression des cytokines pro-inflammatoires était aussi réduite sous catéchines. Troisième temps : étude d'intervention de 7 mois chez 44 dialysés, 30 recevant un placebo et 14 des catéchines du troisième au cinquième mois ; avant dialyse, les 14 sous catéchines avaient, par rapport aux 30 autres, une plus faible activité plasmatique du peroxyde d'hydrogène, de l'activité hypochlorite, du peroxyde phosphatidyl-choline, de la protéine C-réactive et des cytokines pro-inflammatoires. Conclusion : les catéchines réduisent la production induite par la dialyse de peroxyde d'hydrogène, de l'hypochlorite, des facteurs de risque d'athérosclérose et de facteurs pro-inflammatoires.

> Dr EMMANUEL DE VIEL

Shih-Pijng Hsu (Taiwan) et coll. « American Journal of Clinical Nutrition », novembre 2007, p. 1539-47.

37^e ANNEE - 21, RUE CAMILLE-DESMOULINS, 92789 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 - TEL. : 01. 73. 28. 12. 70 - ISSN 0399 - 2659 - CPPAP 0412 T 81257

Rhinosinusites aiguës

présümées d'origine virale avec congestion nasale, céphalée et/ou fièvre de l'adulte (à partir de 15 ans)

RhinAdvil

Ibuprofène 200 mg + chlorhydrate de pseudoéphédrine 30 mg

Décongestionnant nasal
Antalgique
Antipyrétique



1 à 2 cp/prise
sans dépasser
6 cp/jour
(5 jours maximum)

RhinAdvil. Boîte de 20 comprimés enrobés.
COMPOSITION : Chlorhydrate de pseudoéphédrine 30 mg, ibuprofène 200 mg par comprimé.
Excipients à effet notoire : saccharose.
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien, l'ibuprofène, et un vasoconstricteur, la pseudoéphédrine. Il est indiqué dans le traitement symptomatique de la congestion nasale associée à une rhinosinusite aiguë présumée virale avec céphalée et/ou fièvre de l'adulte (à partir de 15 ans).
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : Voie orale. Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, de préférence au cours des repas. RÉSERVÉ À L'ADULTE (À PARTIR DE 15 ANS). 1 comprimé par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures. En cas de symptômes plus intenses, 2 comprimés par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour. Dans tous les cas, ne jamais dépasser la posologie maximale de 6 comprimés par jour. La durée maximale du traitement est de 5 jours.
CONTRE-INDICATIONS : - Enfants de moins de 15 ans, - à partir du 6^e mois de grossesse, - antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise d'ibuprofène ou de substances d'activité proche telles qu'autres AINS, aspirine, ou antécédent d'allergie aux autres constituants du comprimé, - ulcère gastro-duodénal en évolution, - insuffisance hépatocellulaire sévère, - insuffisance rénale sévère, - hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée par le traitement, - antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de facteurs de risque susceptible de favoriser la survenue d'accident vasculaire cérébral en raison de l'activité sympathomimétique alpha du vasoconstricteur, - insuffisance coronarienne sévère, - risque de glaucome par fermeture de l'angle, - risque de rétention urinaire liée à des troubles uréthroprostatiques, - antécédents de convulsions, - lupus érythémateux disséminé, - en association : * à des médicaments vasoconstricteurs tels que bromocriptine, pergolide, lisuride, carbogélide, ergotamine, dinitroergotamine ou d'autres médicaments destinés à décongestionner le nez administrés par voie orale ou par voie nasale, (phénylpropanolamine, phényléphrine, éphédrine...), * avec les IMAO non sélectifs (proniazide), - allaitement.
Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ : - jusqu'au 5^e mois inclus de la grossesse, - en association avec : - les anticoagulants oraux, d'autres AINS (y compris l'aspirine à fortes doses), les héparines à doses curatives ou chez le sujet âgé, le lithium, le méthotrexate (doses supérieures à 15 mg/semaine). MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI, INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, GROSSESSE ET ALLAITEMENT, EFFETS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES, EFFETS INDÉSIRABLES, SURDOSAGE, PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES, DONNÉES PHARMACÉUTIQUES : cf. Vidal, AMM : 334 084.8. PRIX : 1,98 €. Remb. Séc. Soc. À 35 %. Agréé coll. cf. Vidal. TEL. : 01 41 02 77 77.

Wyeth
Santé Familiale

Cœur Défense, Tour A - 92931 Paris - La Défense Cedex



Illustration P.0215 - Février 2005 - Crédit photo : Sunset